

Tab.4 - PERSONE DI 11 ANNI E PIU' PER CONSUMO QUOTIDIANO ECCEDENTARIO DI BEVANDE ALCOLICHE, PER SESSO E CLASSI DI ETA' - ANNO 2005
(per 100 persone della stessa età e sesso)

	MASCHI	FEMMINE
CLASSE DI ETA'	4 e più unità	3 e più unità
11-15	0,1	0,1
16-17	1,3	0,2
18-19	1,4	0,8
20-24	5,8	0,9
25-29	7,3	1,6
30-34	7,4	1,7
35-44	10,3	2,2
45-54	13,8	2,9
55-59	15,7	3,3
60-64	15,6	3,6
65-74	16,0	3,0
75 e più	8,7	1,7
Totale	10,3	2,2

Fonte : ISTAT - L'uso e l'abuso di alcol in Italia - anno 2005

Tab.5 - PERSONE DI 11 ANNI E PIU' CHE SI SONO UBRIACATE ALMENO UNA VOLTA NEGLI ULTIMI 12 MESI E NUMERO DI VOLTE IN CUI SI SONO UBRIACATE, PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE - ANNO 2005
(per 100 persone della stessa ripartizione geografica)

	Numero di ubriacature nel corso degli ultimi 12 mesi				
	Almeno una ubriacatura	1-3 volte	4-6 volte	7-12 volte	più di 12 volte
Italia nord-occidentale	8,7	48,4	13,9	10,9	11,3
Italia nord-orientale	10,8	48,3	18,7	12,3	7,6
Italia centrale	8,5	49,8	14,5	11,2	6,6
Italia meridionale	7,1	56,6	13,8	10,2	4,8
Italia insulare	6,1	50,2	13,8	10,9	6,2
Italia	8,4	50,4	13,1	11,1	7,7

Fonte : ISTAT - L'uso e l'abuso di alcol in Italia - anno 2005

Tab. 6 a - USO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE 15-54 ANNI E SCOLARITA'

Ubriacarsi negli ultimi trenta giorni	Elementari	Medie Inferiori	Medie Superiori	Laurea
non uso	0,8%	26,9%	46,7%	25,6%
uso	0,7%	24,2%	53,9%	21,3%

Fonte: IPSAD@Italia2005

Tab. 6 b - USO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE 15-54 ANNI E CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Ubriacarsi negli ultimi trenta giorni	Occupato	Studente	Disoccupato	Altro*
non uso	61,4%	26,5%	6,3%	5,8%
uso	40,1%	51,2%	7,1%	1,6%

* Volontario in forma breve, casalinga, inabile al lavoro, pensionato

Fonte: IPSAD@Italia2005

**Tab.7- GRADUATORIA DELLE PERSONE DI 11 ANNI E PIU' CHE CONSUMANO
QUOTIDIANAMENTE ALCOL PER REGIONE - ANNO 2005**
(per 100 persone della stessa Regione di residenza)

Regioni	Consumo nell'anno	Regioni	Consumo giornaliero
Veneto	76,2	Marche	38,2
Trentino-Alto Adige	75,4	Liguria	36,8
Emilia-Romagna	74,2	Toscana	36,1
Friuli-Venezia Giulia	73,7	Molise	36,1
Valle d'Aosta	73,1	Emilia-Romagna	34,7
Lombardia	72,6	Veneto	34,7
Piemonte	72,5	Basilicata	34,7
Toscana	72,4	Umbria	34,3
Marche	72,3	Puglia	33,9
Umbria	70,3	Valle d'Aosta	33,7
Liguria	69,8	Piemonte	33,6
ITALIA	69,7	Friuli-Venezia Giulia	33,4
Abruzzo	68,1	Abruzzo	31,4
Basilicata	67,0	Lombardia	31,4
Puglia	66,8	ITALIA	31,0
Lazio	66,6	Lazio	28,4
Calabria	66,6	Sardegna	27,0
Campania	65,3	Campania	26,8
Molise	64,7	Trentino-Alto Adige	26,3
Sardegna	64,0	Calabria	24,8
Sicilia	61,2	Sicilia	21,5

Fonte : ISTAT - L'uso e l'abuso di alcol in Italia - anno 2005

Tab.7 a - USO DI BEVANDE ALCOLICHE E UBRIACATURE NEGLI STUDENTI 15-19 ANNI ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bevande alcoliche	86,5%	89,4%	87,4%	89,0%	90,8%	91,9%	91,2%
Ubriacarsi	52,7%	55,0%	55,2%	54,6%	56,4%	56,9%	55,8%

Fonte: ESPAD@Italia2005

Tab.7 b - USO DI BEVANDE ALCOLICHE E UBRIACATURE NEGLI STUDENTI 15-19 ANNI ALMENO UNA VOLTA NEGLI ULTIMI 12 MESI

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bevande alcoliche	78,5%	82,2%	85,1%	85,6%	84,9%	86,2%	85,4%
Ubriacarsi	38,9%	40,4%	41,9%	42,3%	40,7%	42,8%	41,4%

Fonte: ESPAD@Italia2005

Tab.8 - PREVALENZA DEI CONSUMATORI (%) DI ALCOLICI FUORI PASTO NELLA CLASSE DI ETÀ 14-17 ANNI - ANNI 1993-2006 (a)

	1993	1994	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2005	2006
Maschi	9,8	13,4	12,9	18,4	15,2	18,0	16,8	17,1	18,3	20,7	20,6	24,2
Femmine	7,1	8,0	6,0	10,8	9,7	12,8	12,2	13,8	11,5	16,2	15,6	16,8

(a) nel 1996 e nel 2004 le informazioni non sono state rilevate

Fonte: ISTAT - "Indagine multiscopo sulle famiglie-Aspetti della vita quotidiana"-Anno 2003; "L'uso e l'abuso di alcol in Italia"- anno 2005

Tab. 9 - APPROVAZIONE E PERCEZIONE DEL RISCHIO NELL'USO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STUDENTI TRA I 15 E I 19 ANNI

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Non disapprovo bere 1 o 2 bicchieri	74,0%	79,0%	76,0%	77,0%	76,6%	75,8%
Non disapprovo ubriacarsi 1 volta la settimana	20,0%	23,0%	25,0%	26,5%	25,6%	24,3%
Nessun rischio nel bere 4 o 5 bicchieri quasi ogni giorno	3,0%	4,0%	4,0%	2,3%	2,1%	3,0%

Fonte: ESPAD@Italia2005

Tab.10 - DISTRIBUZIONE PER ETA' (%) DEGLI UTENTI DEI SERVIZI O GRUPPI DI LAVORO RILEVATI

Totale utenti

CLASSI DI ETA'	Maschi										Femmine										Totale									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<20	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,8	0,5	0,7	0,4	0,6	0,7	0,7	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7
20-29	8,6	9,4	9,0	9,6	9,5	9,2	10,1	10,3	10,7	12,0	6,0	6,7	6,1	7,1	6,0	6,1	6,0	6,0	6,5	7,5	7,9	8,8	8,3	9,1	8,7	8,5	9,1	9,3	9,8	11,0
30-39	22,1	24,6	22,6	23,6	24,4	24,1	25,2	24,8	24,8	25,0	23,8	24,0	22,8	23,0	22,7	22,4	23,2	20,4	21,2	21,9	22,5	24,4	22,6	23,4	24,0	23,7	24,8	23,7	24,0	24,3
40-49	29,6	28,5	27,9	26,9	26,4	27,3	27,4	28,5	28,1	28,1	31,3	31,9	29,8	29,0	30,9	31,0	31,3	29,4	32,6	31,7	30,0	29,3	28,4	27,4	27,5	28,2	28,3	28,8	29,1	28,9
50-59	25,2	23,2	24,3	24,7	24,3	23,1	23,2	22,9	21,8	21,2	25,6	24,2	25,5	25,6	25,6	24,3	25,6	26,9	23,8	23,3	25,3	23,4	24,6	24,9	24,6	23,4	23,7	23,9	22,3	21,6
>=60	14,1	13,7	15,5	14,5	14,8	15,6	13,6	12,9	13,9	13,1	12,9	12,5	15,4	14,7	14,1	15,5	13,5	16,8	15,2	14,9	13,8	13,4	15,5	14,6	14,6	15,6	13,6	13,9	14,2	13,5
TOTALE	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Nuovi utenti

CLASSI DI ETA'	Maschi										Femmine										Totale									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<20	0,8	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1	1,0	1,3	0,8	0,9	0,7	0,8	1,2	0,8	0,7	1,1	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	0,7	1,1	1,0	1,3
20-29	11,0	11,7	11,6	12,8	12,7	12,7	13,5	14,5	15,4	16,9	7,1	8,4	7,8	8,2	8,6	8,5	7,5	8,5	8,7	11,1	10,0	10,9	10,7	11,8	11,8	11,8	12,2	13,2	14,0	15,7
30-39	23,1	25,5	24,2	25,5	26,2	26,0	26,5	26,3	26,4	26,9	24,8	25,0	23,5	23,9	22,8	24,4	23,9	22,1	22,3	23,4	23,5	25,4	24,0	25,1	25,5	25,6	25,9	25,4	25,6	26,1
40-49	28,9	26,6	26,2	24,7	24,4	25,6	26,6	26,6	26,1	25,9	31,1	31,2	28,8	28,9	28,6	29,2	32,1	29,5	32,2	30,2	29,5	27,7	26,7	25,7	25,4	26,3	27,8	27,2	27,4	26,8
50-59	22,8	22,1	22,0	23,1	23,4	20,4	21,1	19,4	18,9	17,9	24,0	22,7	24,0	23,7	25,5	21,8	23,8	21,6	21,2	20,3	23,1	22,3	22,4	23,3	23,9	20,7	21,7	19,9	19,4	18,4
>=60	13,4	13,1	14,9	12,7	12,1	14,4	11,5	12,1	12,1	11,1	12,2	11,7	15,3	14,5	13,4	15,4	12,2	17,3	14,6	13,7	13,1	12,8	15,0	13,1	12,4	14,6	11,6	13,2	12,6	11,6
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria-Uff.VII

**Tab. 11 a - USO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STUDENTI 15-19 ANNI
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA E SCOLARITA' DEI GENITORI**

Bevande alcoliche	Bassa (licenza media)	Medio-Alta (diploma o laurea)
non uso	37,0%	63,0%
uso	31,1%	68,9%

Fonte: ESPAD@Italia2005

**Tab. 11 b - UBRIACATURE NEGLI STUDENTI 15-19 ANNI
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA E SCOLARITA' DEI GENITORI**

Ubriacarsi	Bassa (licenza media)	Medio-Alta (diploma o laurea)
non uso	31,4%	68,7%
uso	31,8%	68,2%

Fonte: ESPAD@Italia2005

**Tab. 12 a - USO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STUDENTI 15-19 ANNI
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA E STATO SOCIO-ECONOMICO
DELLA FAMIGLIA (percepito dagli studenti)**

Bevande alcoliche	Basso*	Medio-Alto**
non uso	7,7%	92,3%
uso	8,4%	91,6%

Fonte: ESPAD@Italia2005

**Tab. 12 b - UBRIACATURE NEGLI STUDENTI 15-19 ANNI
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA E STATO SOCIO-ECONOMICO
DELLA FAMIGLIA (percepito dagli studenti)**

Ubriacarsi	Basso*	Medio-Alto**
non uso	7,4%	92,6%
uso	9,1%	90,9%

Fonte: ESPAD@Italia2005

* Basso: situazione economica familiare "al di sotto" rispetto alle altre famiglie italiane

** Medio-Alto: situazione economica familiare "pari o al di sopra" rispetto alle altre famiglie italiane

**Tab.13a- GIOVANI EUROPEI 15-24 ANNI CHE AFFERMANO
DI BERE ALCOL REGOLARMENTE (%)**

UE-15	27%
DK	65%
IE	61%
NL	56%
UK	54%
BE	34%
FI	31%
SE	31%
ES	29%
AT	25%
LU	22%
PT	19%
DE	18%
EL	18%
FR	12%
IT	12%

Fonte: Flash Eurobarometer "Young people and drugs"-giugno 2004

**Tab. 13b-GIOVANI EUROPEI 15-24 ANNI CHE CONSIDERANO
MOLTO PERICOLOSO L' ALCOL (%)**

EU 15	13%
DK	3%
NL	3%
FI	5%
DE	11%
EL	11%
PT	11%
UK	11%
AT	12%
BE	12%
ES	12%
IE	12%
LU	12%
SE	13%
FR	20%
IT	20%

Fonte: Flash Eurobarometer "Young people and drugs"-giugno 2004

Tab.14 a- GIOVANI EUROPEI 15-24 ANNI CHE CONSIDERANO MOLTO PERICOLOSI ALCOL, CANNABIS E COCAINA (%)

	Alcohol	Cannabis	Cocaine
EU 15	13%	24%	76%
BE	12%	21%	82%
DK	3%	8%	65%
DE	11%	28%	76%
EL	11%	40%	83%
ES	12%	22%	66%
FR	20%	20%	80%
IE	12%	31%	72%
IT	20%	20%	78%
LU	12%	19%	71%
NL	3%	6%	67%
AT	12%	21%	79%
PT	11%	35%	84%
FI	5%	30%	79%
SE	13%	44%	84%
UK	11%	26%	73%

Fonte: Flash Eurobarometer "Young people and drugs"-giugno 2004

Tab.14 b - GIOVANI EUROPEI 15-24 ANNI CHE CONCORDANO CON L'AFFERMAZIONE "CHI BEVE HA PIU' PROBABILITA' DI SPERIMENTARE ANCHE LA DROGA " (%)

EU 15	37%
SE	52%
IE	45%
PT	45%
UK	44%
ES	43%
FI	43%
DE	40%
DK	35%
EL	35%
FR	34%
IT	29%
NL	29%
AT	27%
BE	24%
LU	23%

Fonte: Flash Eurobarometer "Young people and drugs"-giugno 2004

Tab.15a - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE DIAGNOSI ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL SECONDO IL SESSO DEL DIMESSO - ANNO 2004

Cause di dimissione (*)		Valore assoluto			Valore percentuale		% diagnosi secondo il tipo di diagnosi
		Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	
291	Sindrome psicotiche indotte da alcool	4.325	1.026	5.351	80,8%	19,2%	5,0%
303	Sindrome di dipendenza da alcool	25.422	7.859	33.281	76,4%	23,6%	30,8%
305.0	Abuso di alcool	8.038	2.973	11.011	73,0%	27,0%	10,2%
357.5	Polineuropatia alcoolica	1.848	472	2.320	79,7%	20,3%	2,1%
425.5	Cardiomiopatia alcoolica	586	80	666	88,0%	12,0%	0,6%
535.3	Gastrite alcoolica	600	274	874	68,6%	31,4%	0,8%
571.0	Steatosi epatica alcoolica	7.586	2.398	9.984	76,0%	24,0%	9,2%
571.1	Epatite acuta alcoolica	3.590	745	4.335	82,8%	17,2%	4,0%
571.2	Cirrosi epatica alcoolica	26.333	7.073	33.406	78,8%	21,2%	30,9%
571.3	Danno epatico da alcool, non specificato	5.268	1.143	6.411	82,2%	17,8%	5,9%
977.3	Avvelenamento da antagonisti dell'alcool	18	7	25	72,0%	28,0%	0,0%
980	Effetti tossici dell'alcool	227	97	324	70,1%	29,9%	0,3%
Totale		83.841	24.147	107.988	77,6%	22,4%	100,0%

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie

Tab. 15 b - DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER DIAGNOSI TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL (cod. ICD 9-CM: 291, 303, 305.0, 357.5, 425.5, 535.3, 571.0, 571.1, 571.2, 571.3, 977.3, 980) - ANNO 2004
(Dimessi per 100.000 abitanti)

Regione di dimissione	<= 14 anni		15 - 35 anni		36 - 55 anni		> 55 anni		Totale
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Piemonte	3,7	2,4	92,6	40,4	362,3	139,4	410,9	96,3	169,5
Valle d'Aosta	12,1	25,9	217,4	91,6	895,6	422,8	1.583,2	310,2	514,6
Lombardia	4,2	4,2	138,4	44,3	370,0	127,6	565,8	114,3	193,4
Prov. Auton. Bolzano	31,5	30,5	373,2	137,8	953,6	334,2	1.626,5	398,4	510,8
Prov. Auton. Trento	2,6	8,3	136,8	33,6	630,7	181,6	1.191,3	224,1	331,9
Veneto	3,7	0,3	99,1	32,7	393,2	162,7	755,0	195,2	232,2
Friuli Venezia Giulia	2,8	0,0	65,4	19,8	394,6	164,8	827,3	205,6	255,6
Liguria	3,4	7,2	207,6	82,9	561,8	202,6	472,9	102,8	241,7
Emilia Romagna	2,4	1,7	123,1	38,4	390,9	143,8	423,2	90,4	179,5
Toscana	4,1	2,4	128,8	50,7	306,4	120,9	276,4	70,3	139,7
Umbria	3,7	7,9	97,5	30,5	231,8	55,0	324,0	50,4	115,9
Marche	3,0	3,2	174,8	66,4	473,4	167,3	370,0	71,3	189,5
Lazio	1,9	2,6	120,4	38,1	361,9	83,8	347,5	69,0	142,7
Abruzzo	5,5	7,0	258,1	63,8	583,0	135,7	637,2	98,6	250,7
Molise	8,8	0,0	191,9	20,8	667,9	144,9	556,2	130,0	242,5
Campania	3,4	1,4	80,9	16,3	246,0	52,1	218,8	60,9	86,9
Puglia	3,9	2,8	102,0	21,0	292,4	61,7	297,9	63,9	111,1
Basilicata	0,0	0,0	115,7	20,1	428,3	73,4	459,7	70,5	159,0
Calabria	5,5	1,9	90,8	22,0	345,8	67,0	443,2	76,7	138,5
Sicilia	6,1	2,2	80,7	14,7	259,9	51,0	201,0	39,4	86,0
Sardegna	5,3	4,7	155,1	30,1	502,9	100,5	557,3	78,6	198,0
Italia	4,2	3,0	118,6	35,0	367,6	112,3	447,9	97,3	165,6

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

Tab.15 c - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE DIAGNOSI TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL (cod. ICD 9-CM: 291, 303, 305.0, 357.5, 425.5, 535.3, 571.0, 571.1, 571.2, 571.3, 977.3, 980) SECONDO LA CLASSE DI ETÀ' DEL DIMESSO - ANNO 2004

Cause di dimissione (*)		2 - 14 anni	15 - 35 anni	36 - 55 anni	> 55 anni	Totale
291	Sindrome psicotiche indotte da alcool	0,1	12,9	49,2	37,7	100,0
303	Sindrome di dipendenza da alcool	0,2	19,5	53,7	26,7	100,0
305.0	Abuso di alcool	1,4	32,3	46,7	19,6	100,0
357.5	Polineuropatia alcoolica	0,0	4,1	45,7	50,1	100,0
425.5	Cardiomiopatia alcoolica	0,2	4,1	36,9	58,9	100,0
535.3	Gastrite alcoolica	0,5	12,0	37,0	50,6	100,0
571.0	Steatosi epatica alcoolica	0,1	8,0	40,2	51,7	100,0
571.1	Epatite acuta alcoolica	0,0	10,7	46,0	43,3	100,0
571.2	Cirrosi epatica alcoolica	0,0	1,8	31,5	66,7	100,0
571.3	Danno epatico da alcool, non specificato	0,0	7,7	42,4	49,9	100,0
977.3	Avvelenamento da antagonisti dell'alcool	0,0	36,0	56,0	8,0	100,0
980	Effetti tossici dell'alcool	16,7	31,2	31,2	21,0	100,0
Totale		0,3	12,4	43,2	44,1	100,0

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie

**Tab. 15d- DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE
PER DIAGNOSI TOTALMENTE ALCOLATTRIBUIBILI
ANNI 2000- 2002- 2003 -2004 (Dimessi per 100.00 ab.)**

REGIONE DI DIMISSIONE	2000	2002	2003	2004
Piemonte	174,2	178,6	168,2	169,5
Valle d'Aosta	398,0	560,5	459,8	514,6
Lombardia	215,8	220,1	204,6	193,4
Prov. Auton. Bolzano	448,0	426,6	420,9	510,8
Prov. Auton. Trento	421,1	357,6	349,0	331,9
Veneto	263,9	251,6	244,8	232,2
Friuli Venezia Giulia	300,0	283,7	264,0	255,6
Liguria	279,2	272,7	250,6	241,7
Emilia Romagna	180,2	184,5	176,9	179,5
Toscana	143,2	149,8	138,9	139,7
Umbria	153,7	119,1	125,0	115,9
Marche	200,9	203,6	194,7	189,5
Lazio	137,4	146,1	143,0	142,7
Abruzzo	243,2	259,4	259,6	250,7
Molise	234,2	286,8	274,7	242,5
Campania	80,3	93,5	82,7	86,9
Puglia	125,4	123,7	113,5	111,1
Basilicata	177,2	164,0	153,1	159,0
Calabria	145,3	149,8	144,8	138,5
Sicilia	72,5	85,7	84,5	86,0
Sardegna	161,1	205,2	195,2	198,0
Italia	172,2	177,1	167,9	165,5

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

**Tab. 15e - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE DIAGNOSI
TOTALMENTE ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL SECONDO LA
CLASSE DI ETÀ DEL DIMESSO - ANNI 2000-2002-2003-2004**

ANNI	<= 14 anni	15 - 35 anni	36 - 55 anni	> 55 anni
2000	0,2	13,8	41,7	44,3
2002	0,3	12,8	42,9	44,1
2003	0,2	12,2	42,7	44,9
2004	0,3	12,4	43,2	44,1

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie

**Tab. 15 f- DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE DIAGNOSI TOTALMENTE
ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL - ANNI 2000-2002-2003-2004**

CAUSE DI DIMISSIONE (*)		% diagnosi secondo il tipo di diagnosi			
		2000	2002	2003	2004
291	Sindrome psicotiche indotte da alcool	5,4%	5,0%	5,1%	5,0%
303	Sindrome di dipendenza da alcool	31,8%	32,2%	31,4%	30,8%
305.0	Abuso di alcool	10,6%	9,1%	9,6%	10,2%
357.5	Polineuropatia alcoolica	2,4%	2,6%	2,4%	2,1%
425.5	Cardiomiopatia alcoolica	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%
535.3	Gastrite alcoolica	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
571.0	Steatosi epatica alcoolica	9,4%	9,5%	9,1%	9,2%
571.1	Epatite acuta alcoolica	5,5%	4,7%	4,2%	4,0%
571.2	Cirrosi epatica alcoolica	26,3%	28,3%	30,0%	30,9%
571.3	Danno epatico da alcool, non specificato	7,0%	6,7%	6,3%	5,9%
977.3	Avvelenamento da antagonisti dell'alcool	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
980	Effetti tossici dell'alcool	0,1%	0,4%	0,3%	0,3%
Totale		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: Ministero della Salute - Scheda di dimissione ospedaliera

(*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie



